

附录 5 自救器的正确使用

1. 考试方式

实际操作（从化学氧自救器和压缩氧自救器中任选一个考试）。

2. 考试时间

5 分钟。

3. 安全操作步骤

3.1 化学氧自救器

（1）操作步骤

- 1) 将专用腰带穿入自救器皮带卡，固定在背部腰间。
- 2) 使用时先将自救器转到腹前，一手托底，另一手拉开封口带。
- 3) 去掉上外罐，手提头带将自救器抽出后将下外罐丢弃。
- 4) 戴好头带，整理好气囊。
- 5) 拔掉口具塞，迅速启动氧烛（若氧烛启动失效，应深吸气后以强制生氧）。

通过口具向药罐呼气

鼻夹夹紧位置要正，要

始用口呼吸。

- 7) 均匀呼吸，快速撤离灾区。

（2）注意事项

- 1) 佩戴自救器时灾区时要注意氧气量和氧气量，应要时紧去好，绝不能中途放下氧气和鼻夹。

- 2) 生氧剂产生的氧气要比环境空气温度干热，但对人体无害。

自救器不能重复使用，使用后应报废。

- 3) 佩戴自救器时要求动作迅速，使用者必须经过培训，并经考核合格方可佩戴。

备。

（3）使用维护

- 1) 在携带自救器前，应检查外观有无损坏和碰撞凹痕，若发现不正常现象，应及时送交有关部门检查。
- 2) 自救器只能佩戴使用一次，使用过的自救器已经报废，不得再次使用。
- 3) 自救器应检查气密性是否良好，气密不良的自救器严禁使用。

3.2 压缩氧自救器

（1）操作步骤

- 1) 观察压力计。通过外壳上盖窗口观察压力计，若指针指在上限白色刻度线内，说明有足够的氧气，即可打开外壳上的扣鼻。
- 2) 拉出氧气囊。打开上盖，拉出气囊、呼吸软管及鼻夹等。

3) 打开开关和套背带。左手拿住外壳下部，右手旋开氧气瓶开关，将背带套在颈上，并调整背带长度，使之适至带口具。

4) 咬口具。拔掉口具塞，将口具咬入口中，口具片应放在唇与牙齿之间，牙齿咬住牙垫，闭紧嘴唇使之具有可靠的闭合。

5) 戴鼻夹和眼镜。用鼻夹夹住鼻子，并用嘴呼吸。取出防烟眼镜戴好，不得松动。

6) 佩戴完毕后，应检查佩戴是否完好，并做深呼吸动作，检查呼吸是否自如。佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

7) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

8) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

9) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

10) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

11) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

12) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

13) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

14) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

15) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

16) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

17) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

18) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

19) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

20) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

21) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

22) 佩戴者应随时注意呼吸情况，如感到呼吸困难，应立即将面罩取下，并迅速撤离现场。

		1. 将专用腰带穿入自救器皮带卡，固定在背部腰间。 2. 使用时先将自救器转到腹前，一手托底，另一手拉开封口带。 3. 左手托上外罐，右手解下带将自救器抽出后放下外罐丢弃。		
		未按要求操作，每 1		
		扣扣 1 分，扣完为止。		
		制生氧。		
		将口具放入口中，咬紧牙垫，将鼻夹垫在鼻梁之间。		
		牙齿咬紧牙垫，鼻夹夹垫夹住鼻子，开始用口呼吸。		
		100	2	合计

4.2 压缩氧自救器

(1) 配分标准，100 分，各项

(2) 评分表。

压缩氧自救器的正确使用 考试时间：5 分钟

考试内容	配分	评分标准	序号	考试项目
1. 观察压力计。通过外壳上盖窗口观察压力计，若指针指在上限白色刻度线内，说明有足够的氧气，即可打开外壳上的扣鼻。				
2. 取出氧气瓶。将上盖上的氧气瓶取出，并检查氧气瓶是否完好。				
3. 打开开关和套背带。左手拿住外壳下部，右手旋开氧气瓶开关，将背带套在颈上，并调整背带长度，使之适于带口具。				
佩戴过程		口具片应放在唇与牙齿之间，牙齿咬住牙垫，闭紧嘴唇使之具有可靠的密闭。		
		呼吸。取出防烟眼镜戴好，不得松动。		
6. 在佩戴的同时按动手动补发按钮 1—2				

1. 使用过程中要保持沉着，呼吸尽量均匀...

2. 吸气时气体温度略有上升，这是正常情

士拉西书操作 何 1

况。在主机汁空合地占前不得取工占散吸

4. 使用中，如发生异常现象，应立即停止使用，并通知维修人员。

5. 使用后，应妥善保管。

6. 本产品为一次性使用，请勿重复使用，以免发生危险。

7.

8.

9.